

Pełny skład **tłuszczów zawartych
w 5 ml BioMarine®* olej z wątrób rekinów głębinowych
o biologicznym składzie (żspm) (100 ml płyn)**

tłuszcze złożone

1.	C30H50	skwalen	951 mg
2.	Alkiloglicerole		895 mg
3.	Etery 1-0-alkilo-2,3-diacylogliceroli (DAGE)		2293 mg

wyższe nienasycone kwasy tłuszczowe

4.	C24:1n9	kwasy nerwonowy (NA)	35 mg
5.	C22:6n3	kwasy cis-4,7,10,13,16,19 -dokozaheksaenowy (DHA)	10 mg
6.	C22:1n11	kwasy cetolowy	76 mg
7.	C21:5n3	kwasy 6,9,12,15,18 -heneikozapentaenowy (HPA)	1 mg
8.	C20:5n3	kwasy cis-5,8,11,14,17 -eikozapentaenowy (EPA)	6 mg
9.	C20:2n6	kwasy cis-11,14-eikozadienowy	5 mg
10.	C20:1n9c	kwasy gondolowy (GA)	209 mg

niższe nienasycone kwasy tłuszczowe

11.	C18:3n3	kwasy α-linolenowy (ALA)	5 mg
12.	C18:2n6c	kwasy linolowy (LA)	11 mg
13.	C18:1n9	kwasy oleinowy (składowa alkoholu selachylowego - C ₂₁ H ₄₂ O ₃)	1019 mg
14.	C17:1n10	kwasy 7-metyl-6-heksadekanowy	9 mg
15.	C14:1n5	kwasy miristoleinowy	3 mg

**nasycone kwasy tłuszczowe i niższe
nienasycone kwasy tłuszczowe grupy omega-7**

16.	C20:0	kwasy arachidowy	13 mg
17.	C18:1n7	kwasy 11-oktadekanowy	33 mg
18.	C18:0	kwasy stearynowy (składowa alkoholu batylowego - C ₂₁ H ₄₄ O ₃)	142 mg
19.	C17:1n7	kwasy cis-10-heptadekanowy	13 mg
20.	C17:0	kwasy heptadekanowy	8 mg
21.	C16:1n7	kwasy palmitoleinowy	119 mg
22.	C16:0	kwasy palmitynowy (składowa alkoholu chimylowego - C ₁₉ H ₄₀ O ₃)	522 mg
23.	C15:0	kwasy pentadekanowy	8 mg
24.	C14:0	kwasy mirystynowy	34 mg

*wartości oszacowane na podstawie analiz laboratoryjnych profilu lipidowego.