



CENEO

UTRATA PRZYTOMNOŚCI

Psie RKO – jak wykonać?

1. Klęknij z tyłu psa ułożonego na prawym boku, ręce trzymaj splecione jedna na drugiej i wyprostowane w łokciach. Podczas RKO cały czas dotykają one klatki piersiowej zwierzęcia.
2. Wykonuj naprzemiennie 30 uciśnień i 2 oddechy przez około 2 minuty. Następnie sprawdź puls i oddech.
3. Ważne! „sztuczne oddychanie” u psa polega na objęciu ustami całego pyska, wraz z nozdrzami.
4. Niepowodzenie stwierdzamy po 20 minutach nieprzerwanej akcji.
5. Jeśli pies wrócił do życia, zapewniaj mu wsparcie i obserwację. Udaj się do lekarza weterynarii.



Mały pies (do 10 kg)
głębokość
1-2,5 cm



Średni pies (10-30 kg)
głębokość
2,5-5 cm



Duży pies (>30 kg)
głębokość
4-7,5 cm

Co zrobić, gdy pies straci przytomność?

1. Ostrożnie podejdz do psa, informując go o swojej obecności.
2. Zabezpiecz Psa:
 - a. Połóż go na prawym boku, na płaskiej i twardej powierzchni w cieniu.
 - b. Otwórz usta i wyciągnij język na zewnątrz, by zapewnić drożność dróg oddechowych. Upewnij się, że nie znajduje się tam żaden przedmiot.
3. Sprawdź tętno: uciskając tętnicę udową lub kładąc dłoń na klatce piersiowej psa, po lewej stronie za jego łokciem.
4. Sprawdź oddech: przykładając lusterko lub wyświetlacz telefonu pod nos – jeśli zwierzę oddycha, na taflę pojawi się para wodna. Można też obserwować, czy klatka piersiowa się unosi.
5. Brak tętna i oddechu – to sygnał do rozpoczęcia RKO. Reanimacje prowadz do powrotu tętna.

Czy wiesz, jakie są prawidłowe parametry u psów?

80-160

Liczba uderzeń serca na minutę

16-24

Liczba oddechów

37,2-38,8°C

Temperatura ciała u psa