



CENEO

| ZADŁAWIENIE

Jak pomóc psu w przypadku zadławienia?

Ocen Stan Zwierzęcia: Czy próbuje kaszleć? Czy może wydychać i wdychać powietrze? Jeśli tak, to zadławienie jest częściowe, jeśli nie to mamy do czynienia z zadławieniem pełnym.

Zadławienie częściowe

- a** Zachęć psa do kaszlu: niech spróbuje samodzielnie usunąć przeszkodę.
- b** Monitoruj sytuację i natychmiast udaj się do weterynarza

Kontynuuj Postępowanie



Jeśli przeszkoda zostanie usunięta i pies zacznie normalnie oddychać, obserwuj go uważnie.

Jeśli pies przestaje oddychać lub traci przytomność, rozpocznij RKO (Resuscytację Krążeniowo-Oddechową)

Wszystkie przypadki zadławienia wymagają natychmiastowej wizyty u weterynarza, nawet jeśli przeszkoda została usunięta.

Zadławienie pełne

- a** Ostrożnie otwórz usta psa i sprawdź, czy widać zablokowaną przeszkodę.
- b** Jeśli widzisz zablokowaną przeszkodę, spróbuj ją delikatnie wyjąć, używając np. szczypiec lub palca.
- c** Uważaj, żeby nie wcisnąć głębiej przeszkody

Jeśli przeszkoda nie wychodzi, zastosuj manewr Heimlicha (nacisk na brzuch)

- Stań z boku psa, ręka blisko tylnych nóg.
- Umieść pięść w odległości około kciuka poniżej zebra.
- Wykonaj szybkie i energiczne ruchy do wewnątrz i do góry
 - aż przeszkoda zostanie usunięta lub pies zacznie kaszleć.